

**Plan Parte D de Medicare de Community Health Choice
(HMO D-SNP)**

Criterios para terapia escalonada

Última actualización 10/09/2019

Productos afectados

APLENZIN 174MG COMP. LIB. PROLONG.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de bupropion genérico SR o bupropion genérico XL.

Productos afectados

APLENZIN 348MG COMP. LIB. PROLONG.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de bupropion genérico SR o bupropion genérico XL.

Productos afectados

APLENZIN 522MG COMP. LIB. PROLONG.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de bupropion genérico SR o bupropion genérico XL.

Productos afectados

ARANESP 10MCG/0.4ML JERINGA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 100MCG/ML INY.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 100MCG/0.5ML JERINGA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 150MCG/0.3ML JERINGA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 200MCG/ML INY

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 200MCG/0.4ML JERINGA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 25MCG/ML INY

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 25MCG/0.42ML JERINGA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 300MCG/ML INY

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 300MCG/0.6ML JERINGA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 40MCG/ML INY

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 40MCG/0.4ML JERINGA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 500MCG/ML JERINGA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 60MCG/ML INY

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

ARANESP 60MCG/0.3ML JERINGA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de RETACRIT.

Productos afectados

duloxetina 40mg cáps. de lib. retard

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

ESTRING 2MG ANILLO VAGINAL

Detalles

Criterios	La terapia escalonada requiere de estudio clínico de CREMA VAGINAL PREMARIN O crema vaginal genérica estradiol.
-----------	---

Productos afectados

febuxostat 40mg comp.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico

Productos afectados

febuxostat 80mg comp.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de alopurinol genérico.

Productos afectados

FETZIMA PAQUETTE

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

FETZIMA 120MG CAP. LIB. PROLONG.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

FETZIMA 20MG CAP. LIB. PROLONG

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

FETZIMA 40MG CAP. LIB. PROLONG.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

FETZIMA 80MG CAP. LIB. PROLONG.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

maleato de fluvoxamina 100mg cáps. de lib. prolong.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

maleato de fluvoxamina 150mg cáps. de lib. prolong.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

LATUDA 120MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de quetiapina genérica.

Productos afectados

LATUDA 20MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de quetiapina genérica.

Productos afectados

LATUDA 40MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de quetiapina genérica.

Productos afectados
LATUDA 60MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de quetiapina genérica.

Productos afectados
LATUDA 80MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de quetiapina genérica.

Productos afectados

LONHALA 0.0025% SOLN INH

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de INCRUSE.

Productos afectados

SPIRIVA 1.25MCG RESPIMAT INH

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de ADVAIR HFA, BREO, DULERA, FLUTICASONE/SALMETEROL o wixela.

Productos afectados
SYMPAZAN 10MG TIRA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de comprimidos de clobazam genérico.

Productos afectados
SYMPAZAN 10MG TIRA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de comprimidos de clobazam genérico.

Productos afectados
SYMPAZAN 10MG TIRA

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de comprimidos de clobazam genérico.

Productos afectados

TRINTELLIX 10MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

TRINTELLIX 20MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

TRINTELLIX 5MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados
VIIBRYD 10MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

VIIBRYD 10/20MG PAQUETE INICIAL

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados
VIIBRYD 20MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados
VIIBRYD 40MG COMP.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere del estudio clínico de uno de los siguientes ISRS genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si la solicitud es para duloxetina, no se requiere de terapia escalonada para neuropatía periférica diabética, fibromialgia o dolor musculoesquelético crónico.

Productos afectados

ZENPEP 10000-32000-42000UNID CÁPS. LIB. RETARD.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de CREON.

Productos afectados

ZENPEP 15000-47000-63000UNID CÁPS. LIB. RETARD.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de CREON.

Productos afectados

ZENPEP 20000-63000-84000UNID CÁPS. LIB. RETARD.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de CREON.

Productos afectados

ZENPEP 25000-79000-105000UNID CÁPS. LIB. RETARD.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de CREON.

Productos afectados

ZENPEP 3000-10000-14000UNID CÁPS. LIB. RETARD.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de CREON.

Productos afectados

ZENPEP 40000-126000-168000UNID CÁPS. LIB. RETARD.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de CREON.

Productos afectados

ZENPEP 5000-17000-24000UNID CÁPS. LIB. RETARD.

Detalles

Criterios La terapia escalonada requiere de estudio clínico de CREON.